

Tabla que muestra mayor afectación de ECN por sexo.2012-2013

SEXO	NUMERO	PORCENTAJE
FEMENINO	13	58.1%
MASCULINO	18	41.9%

Fuente Arch.Clin HRRB.

Tabla que muestra el peso de los RN con ECFN en la sala de neonatos en HRRB periodo 2012-2013

PESO	NUMERO	PORCENTAJE
<1000 g	0	0.0%
1000-1500 g	10	32.3%
1500-2500 g	14	45.2%
2500-3500	7	22.6%

Fuente Arch.Clin HRRB.

Tabla que muestra la edad gestación de los RN con ECN en neonatos HRRB periodo 2012-2013

EDAD GESTACIONAL	NUMERO	PORCENTAJE
>42	1	3%
37 -42	9	29%
36.6-35	6	19%
34.6-32	12	39%
31.6-30	3	10%
29.6-28	0	0%
<28	0	0%

Fuente Arch.Clin HRRB.

Tabla que muestra el peso para la edad gestacional de los RN con ECN en la sala de neonatología periodo 2012-2013

PESO	NUMERO	PORCENTAJE
Bajo	20	65%
Adecuado	11	35%
Alto	0	0%

Fuente Arch.Clin HRRB.

Tabla . Muestra principales causas de egreso en los RN con ECN en la sala de neonatos periodo 2012-2013.

CAUSA	NUMERO	PORCENTAJE
Defunción	4	13%
Mejoría	27	87%

Fuente Arch.Clin HRRB.

**Tabla 1. Prevalencia , mortalidad y letalidad en recién nacidos con enterocolitis necrosante.
Hospital Regional Rio Blanco. 2012 -2013**

Nacidos Vivos	6766
Numero de casos	31
Defunciones	4
Tasa de prevalencia*	3.2
Tasa de mortalidad °	0.59%
Tasa de Letalidad<	12.9%

*Casos de RN con ECN x 100 Nacidos vivos

°Defunciones de RN con ECN x 1000 Nacidos vivos

<Defunciones de RN con ECN x 100 casos RN de ECN

Fuente Arch.Clin HRRB.

Tabla 2 Categorías de ECN observadas en los RN del HRRB periodo 2012-2013

ESTADIO	NUMERO	PORCENTAJE
I A	27	87%
I B	2	6.45%
II A	0	0
II B	0	0
III A	0	0
III B	2	6.45%

Fuente Arch Clin HRRB.